N° 28

observation
sur une hidropisie enkistée des ovaires suivie d'epenchement dans la cavité de L'abdomen et dans celle de la poitrine.

par M. Lachaud.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

La personne qui fait le sujet de cette observation, etoit une dame agée de 36 ans, d'une complexion fort delicate; cequi donna lieu a plusieurs maladies dont elle fut affectée dés sa plus tendre enfançe. parvenue a l'age de puberté, elle fut. asses bien reglée; ce qui a presque continué jusqu'au tems de sa mort: avec cependant cette circonstance, que chaque periode de ces menstrues etoit le plus souvent annoncé par un crachement de sang.

cette personne fut mariée à 18. ans; à 30. elle devint grosse pour la premiere fois; mais elle fit une fausse couche, qui n'eut aucune suite facheuse. deux ans apres elle redevint grosse et elle accoucha au tems ordinaire: cet accouchement et ces suites se passerent selon les loix de la nature, c'est a dire ~~tres~~ heureusement. l'enfant au quel elle donna le jour, est une fille, qui jouit presentement d'une asses bonne santé.

ce ne fut que plus de deux ans apres ce dernier accouchement, que cette dame (qui avoit toujours eu une santé fort valetudinaire) s'appercut d'une grosseur dans l'hipogastre gauche. on consulta alors les plus grands praticiens entre autres M.r Morand et l'on reconnut que s'etoit l'ovaire gauche qui formoit cette tumeur.

aucun moyen interne usité dans l'art de guerir ne fut mit en oublie; pour tacher de combattre une maladie qui annonçoit des suites facheuses. l'epenchement d'un fluide dans la cavité du bas ventre se manifesta; une grande oppression qui se joignit a ces accidens, annonça (conjointement avec d'autres signes) qu'il se faisoit aussi un epenchement dans la capacité de la poitrine: les jambes et les cuisses devinrent fort œdemateuses; des douleurs tres aigues se faisoient ressentir dans ces dernieres parties et principalement dans la cuisse droite. tous ces accidens se succederent les uns aux autres dans l'espace de six mois, sans qu'on ait put mettre un frein a aucuns d'eux.

ARC 39 n° 88

La malade etoit alors dans un marasme tres considerable; l'etat deplorable dans le quel elle se trouvoit, l'obligea enfin dans le huitieme mois d'avoir recours a la chirurgie pour extraire les eaux contenues dans l'abdomen. dans ce tems les douleurs qu'elle ressentoit dans les cuisses et specialement dans la droite augmenterent beaucoup. ~~la malade~~ elle ne jouissoit de quelque moment de tranquilité, qu'au moyen des frictions seches qu'on lui faisoit continuellement sur les parties affectées; on y appliqua pour lors des vesicatoires, dans la vue de procurer une evacuation des eaux; on n'en eut pas tout l'effet qu'on en esperoit; mais leurs applications fit cesser entierement ces douleurs qui la tourmentoit considerablement. on fit ensuite (dans l'intention seulement de la soulager) l'operation de la parachenthese, par le moyen de la quelle on evacua environ six pintes d'une liqueur sereuse et roussatre, qui ayant eté mise sur le feu prit la consistence de l'empoid. le fluide extrait on reconnu manifestement deux tumeurs; une tres considerable formé par l'ovaire ~~droite~~ gauche, qui occupoit toute la region iliaque gauche et la partie anterieure du ventre. l'autre tumeur etoit grosse comme un oeuf d'oye et parut etre l'ovaire droit.

La malade ne retira pas de cette operation un calme marqué. des foiblesses, des palpitations et des anxietés aux quelles elle etoit sujette devinrent plus frequentes; ce qui la mettoit a chaque moment aux portes de la mort. elle succomba enfin a tant de maux dans le neuvieme mois en date du tems ou elle s'etoit apperçue pour la premiere fois de sa tumeur.

nous fimes l'ouverture de son cadavre, dont voicy le detail

en incisant les tegumens du bas ventre et le peritoine, il s'ecoula une asses grande quantité d'un fluide pareil a celui qui nous avions tiré precedemment par le moyen de la paracenthese. le fluide ecoulé et les parties cy dessus ennoncées incisées; il se presenta une tumeur tres considerable, que nous avons dit etre formé par l'ovaire gauche; nous appercumes aussi celle qui etoit faite par l'ovaire droit. nous abandonames

pour un moment ces parties pour les examiner ensuite tres scrupuleusement et nous passames a l'inspection des autres organes. a peine pumes nous trouver des vestiges de l'epiploon; le ventricule etoit sain, mais fort retrecie; tout le canal intestinal etoit dans un etat naturel, si ce n'est le colon qui etant extremement distendu par des vents, avoit plus de quatre fois son calibre ordinaire. le pancreas fut trouvé totalement scirreux; plusieurs points du mesentere l'etoient aussi. le foye avoit des tubercules a son grand lobe et a son bord tranchant. la vesicule du fiel, la ratte, les reins, les uretheres et la vessie n'avoient rien de contre nature.

La capacité de la poitrine renfermoit environ quatre pintes d'une liqueur limphatique et sanguinolente; il y en avoit trois du coté droit et une du côté gauche. le poulmon droit etoit tellement retiré, qu'il n'occupoit que la partie superieure du thorax; il etoit adherent tant anterieurement que posterieurement a la pleure ~~et etoit meme tombé en supuration~~. le poulmon gauche baignoit dans une moindre quantité de fluide que le droit, il avoit pris adherence a la pleure, mais seulement dans sa partie posterieure. le mediastin n'avoit rien de particulier. le pericarde contenoit une tres grande quantité de liqueur, ce qui l'avoit considerablement distendu. le ventricule gauche du cœur etoit dilaté a un point extraordinaire. le droit etoit dans son etat naturel, de meme que le diaphragme.

nous ne poussames pas plus loing nos recherches et nous revinmes aux ovaires.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

avant que de rien deplacer nous vimes que l'ovaire —
gauche etant appuyé sur la matrice en avoit —
devié le fond en devant; cet organe etoit asses —
sain, si ce n'est un petit point scirrheux qui —
etoit dans sa partie posterieure. la quelle partie —
posterieure etoit devenue la superieure par le —
deplacement que la presence de la tumeur avoit —
occasionné.

L'ovaire droit avoit causé aussi de son coté, par —
la pression, le derangement de l'intestin coecum.

ces tumeurs n'avoient cependant contractées —
d'adherence avec aucunes parties circonvoisines. pour
pouvoir mieux les examiner, nous les enlevames du —
bassin conjointement avec la matrice; a la quelle —
elles etoient attachées au moyen de leur ligament —
rond. les trompes mais particulierement la gauche —
etoient fort gonflées; cette derniere avoit fait un —
contour sur la tumeur de son coté et son pavillon —
y etoit totalement epanoui.

La tumeur formé par l'ovaire gauche etoit tres —
considerable; elle renfermoit aux environ de six —
pintes de fluide et pouvoit peser (la liqueur evacuée)
douse a quinse livres.

le tissu de l'ovaire avoit eté tellement forcé de se
dilater par la presence de l'humeur qu'il contenoit, —
que les trois quarts de la tumeur n'etoit qu'un —
composé de vesicules transparentes qui en occupoient
la surface: ensorte qu'on ne pouvoit pas manier —
cette tumeur sans que plusieurs de ces vesicules ne
se crevassent. ce qui donnoit jour a l'ecoulement de
l'humeur qui y etoit renfermée. il y a meme lieu de —
croire que l'epanchement dans le bas ventre provenoit de la rupture de
ces vesicules.

nous incisames cette tumeur dont la cavité etoit divisée en quantité de loges et sous divisée en cellules de differentes grandeurs et figures. le fluide qu'elles contenoient n'avoit pas dans toutes ny la meme consistence, ny la meme couleur, ny la meme qualité: en effet, dans les unes il etoit epais, dans d'autres tres clair; dans les unes il etoit jaune, dans d'autres fort blanc. tantot purulent, tantot limphatique enfin tantot sanguinolent. tous ces changemens arrivoient a l'ouverture des differens foyers qui constituoient la tumeur.

il s'est meme trouvé dans la cavité de quelqu'unes de ces cellules, des petits globes membraneux tres greles remplis d'une humeur dont une petite portion etoit gelatineuse, le reste etoit limpide et transparent. ces petits balons liquoreux (connus sous le nom d'hidatides) nageoient dans le fluide qui etoit contenu dans ces cellules.

L'ovaire droit ne differoit du gauche, par ~~que du coté~~ ~~de~~ la grosseur. la surface exterieure de cet ovaire formoit plusieurs vesicules transparentes qui ressembloient aux cloches qui sont causées par des brulures.

il y a environ deux mois que nous presentames ces pieces a l'academie et l'on verifia tout ce que nous venons d'en etablir.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

on voit par cette observation 1.° que la tumeur avoit deja acquit une certaine grosseur avant que d'etre reconnue. 2.° que les signes rationels n'en avoient rien annoncé. 3.° que ce n'est que par les signes sensibles que la maladie a eté constaté. 4.° enfin ne peut on pas inferer que si la maladie avoit eté mise dés son commencement entre les mains des chirurgiens, on auroit pû (comme il est avancé dans les memoires de cette academie) prolonger les jours de la malade; plûtot que de l'accabler d'une prodigieuse quantité de remedes ~~interieurs~~ inutiles qui n'ont fait qu'alterer davantage son temperament et augmenter la maladie de poitrine, qui vraisemblablement ~~###~~ a eté la cause d'une mort si prochaine.

La tumeur des ovaires est une maladie asses commune; nous connoissons presentement trois personnes qui en sont affectées; l'une est une fille agée de vingt quatre ans qui a l'ovaire gauche gros comme un petit melon; elle porte cette tumeur sans incommodité depuis l'age de quatorse ans, qu'elle a commencé a se manifester et qui c'est accrue par gradation jusqu'au point ou elle est. cette fille est bien reglée, elle eut il ya dix huit mois une fievre maligne qui a durée cinquante deux jours; sans pour cela que sa tumeur ~~###~~ ait subit aucun changement. la seconde personne est une dame agée d'environ soixante et dix ans, qui n'a pas eut d'enfans, elle a depuis vingt ans l'ovaire gauche tumefié de la grosseur d'un fort gros melon. cette dame a eut depuis trois ans des pertes de sang tres considerables et une pesanteur constante dans la region iliaque gauche; la presence de cette tumeur a produit une descente incomplette de matrice, et l'anus se trouve forcé de sortir frequemment.

La troisieme personne est une dame d'envison quarante huit ans, qui depuis huit mois sent une douleur mediocre dans la region iliaque gauche, ou par degres il s'est formé une tumeur qui aujourdhuy a le volume d'un pain rond pesant une livre; il n'y a d'autre accident qu'une pesenteur inquietante; la matrice est un peu descendu dans le vagin dont il exude un ecoulement sereux asses abondant. cette malade vient de prendre deux saisons les eaux de plombieres et la douche sur la partie affectée, sans que cela lui ait procuré aucun soulagement. on a remarqué que cette tumeur est venü dans le temps du derangement des regles pendant le quel temps il y a eut des pertes de sang tres abondantes.

nous ne dirons rien de plus qu'en a present sur cette matiere, nous proposant de la traiter plus amplement lorsque nous aurons un nombre plus considerable de faits.

a paris le 17 8bre 1759.

Lachaud   Lachaud 2me